

Allegato 1 | Domande del sondaggio sulla prescrizione off-label delle gliflozine (SGLT2 inibitori) in pazienti con diabete di tipo 1 da parte dei diabetologi italiani.

1. In quale anno ti sei specializzato?
2. In quale regione italiana svolgi prevalentemente la tua attività professionale?
3. In quale tipo di struttura svolgi prevalentemente la tua attività professionale?
 - Ambulatorio di diabetologia sul territorio
 - Ambulatorio di diabetologia con base in un ospedale non universitario
 - Ambulatorio di diabetologia con base in un ospedale universitario
 - Ambulatorio privato
 - Ambulatorio privato convenzionato
4. Quante persone con T1DM segui di persona mediamente in un anno?
 - Nessuno
 - Meno di 50
 - 50-200
 - Più di 200
5. Nella tua pratica clinica hai prescritto “off-label” SGLT2i a persone con T1DM?
 - No
 - Sì
6. Nella tua pratica clinica a quante persone con DT1 hai prescritto “off-label” SGLT2i?
 - _____
 - Non ricordo
7. Le persone con T1DM a cui hai prescritto “off-label” un SGLT2i erano in terapia con: (è possibile indicare entrambe le modalità di terapia insulinica)
 - Microinfusore
 - Iniezioni multiple
 - Non ricordo
8. Le persone con T1DM a cui hai prescritto “off-label” un SGLT2i utilizzavano: (è possibile indicare più modalità di controllo della glicemia)
 - Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG)
 - Flash Glucose Monitoring (FGM)
 - Continuous Glucose Monitoring (CGM)
 - Non ricordo
9. La tua prescrizione “off-label” di SGLT2i a persone con T1DM è stata dettata da quale dei seguenti fattori? (è possibile indicarne più di uno)
 - Richiesta del paziente
 - Per i risultati presentati in letteratura/presentazione ai congressi
 - Per migliorare il controllo glicemico non ottimale
 - Per favorire la perdita di peso
 - Per migliorare il controllo pressorio
 - Per ridurre il rischio cardiovascolare
 - Per ridurre il fabbisogno di insulina
 - Per la riduzione del rischio di ipoglicemia
 - Per ridurre la glicemia a digiuno piuttosto che la post-prandiale
 - Altro (specificare): _____
10. Quando hai prescritto un SGLT2i a una persona con T1DM le hai chiesto di firmare un consenso informato per l’uso “off-label” del farmaco?
 - No
 - Sì
 - Non ricordo
11. Quando hai prescritto “off-label” un SGLT2i a una persona con T1DM hai aggiunto al suo piano terapeutico per strisce, lancette e aghi, anche strisce per la misurazione dei chetoni? (è possibile indicare più risposte)

- No
 - No, perché le strisce per la misurazione dei chetoni nelle urine erano già incluse nel piano terapeutico
 - No, perché strisce per la misurazione dei chetoni nel sangue erano già incluse nel piano terapeutico
 - Sì, ho aggiunto strisce per la misurazione dei chetoni nelle urine
 - Sì, ho aggiunto strisce per la misurazione dei chetoni nel sangue
 - Non ricordo
12. Quale tra le seguenti raccomandazioni per limitare lo sviluppo di chetosi hai dato alla persona con T1DM al momento della prescrizione “off-label” di SGLT2i? (è possibile indicare più di una raccomandazione)
- Abbondante idratazione per os
 - Misurazione dei chetoni in caso di glicemia alta
 - Misurazione dei chetoni in caso di malattie intercorrenti febbrili/malessere
 - Non iniziare una dieta a basso contenuto di carboidrati se non dopo aver consultato il diabetologo
 - Evitare periodi di digiuno prolungato
 - Rivedere le principali cause e sintomi di chetosi
 - Nessuna delle raccomandazioni precedenti
 - Non ricordo
13. Quando hai prescritto “off-label” un SGLT2i a una donna con T1DM in età fertile (18-45 anni) quale delle seguenti raccomandazioni hai fatto? (è possibile indicare più di una raccomandazione)
- La necessità di utilizzare una contraccezione efficace se sessualmente attive
 - Il fatto che non sono noti gli effetti degli SGLT2i sul prodotto al concepimento
 - La necessità di iniziare un percorso di programmazione quando la paziente desiderasse una gravidanza
 - Di sospendere subito il SGLT2i in caso di gravidanza non programmata
 - Nessuna di queste raccomandazioni
 - Non ricordo
14. Quando hai prescritto “off-label” un SGLT2i a una persona con T1DM a quale livello di glicemia hai consigliato di misurare i chetoni?
- Per nessun livello di glicemia
 - >150 mg/dl
 - >200 mg/dl
 - >250 mg/dl
 - >300 mg/dl
 - >350 mg/dl
 - Non ricordo
15. Nella tua esperienza, le persone con T1DM alle quali hai prescritto SGLT2i ti hanno riferito:
- Di essere soddisfatti del trattamento con SGLT2i
 - Di essere né soddisfatti né insoddisfatti del trattamento con SGLT2i
 - Di essere insoddisfatti del trattamento con SGLT2i
 - Non ricordo
16. Con quale modalità hai prescritto “off-label” un SGLT2i a una persona con T1DM, oltre al consenso informato? (è possibile indicare più di una modalità)
- Su ricettario rosso/bianco SSN
 - Su ricettario bianco UO (farmaco a pagamento)
 - Su ricettario personale (farmaco a pagamento)